

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

目の疲れ・かゆみ・充血に

第2類医薬品

オプターナ 黄粹目薬

—おうすい—

生薬由来成分配合

製品の特徴

- ◆ オプターナ黄粹目薬は、生薬由来成分「ベルベリン硫酸塩水和物」と「グリチルリチン酸二カリウム」を含む、6つの有効成分の働きであなたの大切な瞳をケアします。
- ◆ さわやかなさしごこちの黄色の目薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人 はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人 緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、目のかゆみ、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえて充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用のみ使用してください。

成分とはたらき

成分	分量 (100mL中)	はたらき
塩酸テトラヒドロゾリン	50mg	血管収縮作用により、目の充血をすばやく取り除きます。
ベルベリン硫酸塩水和物	10mg	生薬由来成分で、抗炎症作用により、目のかゆみ・充血などの諸症状を改善します。
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみをしずめます。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)	1,000mg	アミノ酸の一種で目に栄養を与え、疲れを和らげます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	500mg	角膜を保護し、目の生理機能を回復します。

添加物として、ホウ酸、l-メントール、エデト酸 Na水和物、クロロブタノール、パラベン、ホウ砂、d-ボルネオールを含有します。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化が生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 本剤の黄色は「ベルベリン」の色です。黄色い液が衣服などにつかないよう、充分注意してください。点眼される際には、ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってから使用してください。

環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解のほどお願い申し上げます。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)

販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

佐賀製薬株式会社

佐賀県三養基郡基山町小倉 481