

アナロンせき止めシロップ

鎮咳去痰薬

アナロンせき止めシロップは、せきとたんに効果のある6種類の成分を配合した飲みやすい液状(シロップ)のせき止め薬です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、腎内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能 せき、たん

用法・用量

年齢	服用量	服用回数
成人(15才以上)	1回10mL	1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用してください。また、約4時間の間隔をおいていただければ1日6回まで服用できます。(添付の目盛付コップではかり服用してください。)
※ 12才～14才	1回 6mL	
12才未満		服用しないでください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤は生葉エキスを含有していますので、まれに沈でんを生じることがあります
効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

成分・分量

成分名	分量(60mL中)	作用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢に作用して、せきをしめます。
d/-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張して、せきをやわらげ、たんの排出を助けます。
グアイフェネシン	180mg	気道粘膜の分泌を促進して、粘稠なたんをうすめて出しやすくなります。
無水カフェイン	60mg	眠気を防ぎます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤。アレルギー性のせきに効果があります。
キキョウ流エキス	0.6mL (キキョウ600mgに相当)	サポニン系の去痰生葉です。気道の分泌物を増加させるとともに、纖毛運動を活発にしてたんの排出を助けます。

添加物:白糖、アルコール、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、カラメル、香料、グリセリン、バニリン、エチルバニリン、プロピレングリコール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)服用後は、瓶のフタをよくしめてください。しめ方が悪いと内容液がもれたり、汚染したりすることがありますので注意してください。
- (5)添付の目盛付コップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (6)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話: 058-278-3933
受付時間: 10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地