

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

肩こり、腰痛、関節痛に

DHC おきゅパッチシート(ホット)

<外用消炎鎮痛薬>

第3類医薬品

DHCおきゅパッチシート(ホット)は、患部の血行を促進し、肩こりや腰痛にともなう痛みをやわらげるお薬です。気になる匂いを抑えて、マイルドな貼り心地。シートに渦巻き状のスリットを入れたことで貼付部に汗をかきにくく、ぴったりフィットするため効果が持続します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。

(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

3. 本剤の使用による強い刺激を避けるための事項。

本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には貼らないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

■ 効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

■ 用法・用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法・用量に関連する注意】

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 貼った患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
3. 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
4. 患部が汗などでぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
5. 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。
6. 本剤の使用により、特に強いかゆみや痛みが出た場合には、使用を中止してください。

■ 成分・分量

1.0㎡中

サリチル酸グリコール	8.00g
ノニル酸ワニリルアミド	0.04g
トメントール	4.50g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、赤色405号を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

医薬品
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00～17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元

株式会社ディー・エイチ・シー

東京都港区南麻布2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>

携帯 <http://www.dhc.jp>