

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ

DHC かゆみ止め軟膏

<外用消炎鎮痒薬>

第3類医薬品

DHCかゆみ止め軟膏は、あせも、かぶれ、湿疹など、日常的な皮膚病に効果を発揮するお薬です。配合成分が炎症、かゆみを抑えるため、無意識のうちに搔きむしるなどして症状が悪化するのを防ぎ、患部を保護します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ・はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

あせも、かぶれ、かゆみ、ただれ、湿疹、皮ふ炎、しもやけ、虫さされ、じんましん

■ 用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください。

【用法・用量に関する注意】

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 外用にのみ使用し、内服しないでください。

■ 成分・分量

100g中

dl-カンフル	0.5g
ジフェンヒドラミン	1g
酸化亜鉛	15g
I-メントール	0.5g

添加物として、グリセリン、ステアリルアルコール、ラノリン、セタノール、プロピレングリコール、流動パラフィン、ミツロウ、ポリオキシエチレンラノリン、ベンザルコニウム塩化物、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、スクワラン、パラベンを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029
受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1
0120-333-906 www.dhc.co.jp