

[使用上の注意]

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること  
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること  
2週間位服用しても症状がよくならない場合

4



# リベルタ胃腸内服液

## 食べ過ぎ 飲み過ぎ 二日酔の むかつき

ウコン  
ガジュツ  
配合

食欲不振 医薬品 30mL

**[効能]** 食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐

**[用法・用量]** 成人(15才以上)1回1本(30mL)を1日3回を限度として服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。○用法・用量を厳守して下さい。○小児には服用させないで下さい。

小林薬品工業株式会社  
製造販売元 岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

お客様相談室 電話 058-278-3933  
受付時間10時から16時まで(土、日、祝日を除く)

[成分・分量] 30mL中

ウイキョウエキス75mg、オウゴンエキス100mg、ケイヒ流エキス0.3mL、ゲンチアナ流エキス0.15mL、ショウキョウエキス15mg、チョウジチンキ0.1mL、チンピエキス50mg、ガジュツエキス10mg、ウコン流エキス0.5mL、塩化カルニチン120mg

添加物：センブリ流エキス、白糖、ローリルビトール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、安息香酸Na、パラベン、ポピドン、L-メントール、香料、グリセリン

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になつたり品質が変わります。)

ガラス：瓶、金属：キャップ

使用期限