

**[使用上の注意]**

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4



副作用被害救済制度  
0120-149-931

# リベルタ胃腸内服液

## 食べ過ぎ 飲み過ぎ 二日酔の むかつき

ウコン  
ガジュツ  
配合

30mL

第2類医薬品

**[効能]** 食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐

**[用法・用量]** 成人(15才以上) 1回1本(30mL)を1日3回を限度として服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。 ○用法・用量を厳守してください。  
○小児には服用させないでください。

小林薬品工業株式会社  
製造販売元 岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

お客様相談室 電話：058-278-3933  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

**[成分・分量]** 30mL中  
ウイキョウエキス75mg、オウゴンエキス100mg、ケイヒ流エキス0.3mL、ゲンチアナ流エキス0.15mL、ショウキョウエキス15mg、チョウジチンキ0.1mL、チンピエキス50mg、ガジュツエキス10mg、ウコン流エキス0.5mL、カルニチン塩化物120mg  
添加物:センブリ流エキス、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、アルコール、安息香酸Na、パラベン、ポピドン、I-メントール、香料、グリセリン

**[保管及び取扱い上の注意]**

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

ガラス：瓶、金属：キャップ

使用期限