

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

ガラス：瓶、金属：キャップ

4



副作用被害救済制度
0120-149-931

1

Medi Mediswan
sione

**食べ過ぎ
飲み過ぎ**

二日酔のむかつき

ウコン・ガジュツ配合

リベルタ胃腸内服液

第2類医薬品 30mL

【効能】食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

【用法・用量】成人(15才以上)1回1本(30mL)を1日3回を限度として服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。○用法・用量を厳守してください。○小児には服用させないでください。

企画元 **株式会社ウイング**

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

お客様相談室 電話：058-278-3933
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

【成分・分量】30mL中

ウイキョウエキス75mg、オウゴンエキス100mg、ケイヒ流エキス0.3mL、ゲンチアナ流エキス0.15mL、ショウキョウエキス15mg、チョウジチンキ0.1mL、チンピエキス50mg、ガジュツエキス10mg、ウコン流エキス0.5mL、カルニチン塩化物120mg

添加物：センブリ流エキス、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、アルコール、安息香酸Na、パラベン、ポビドン、L-メントール、香料、グリセリン

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

使用期限