


ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

湿疹・皮膚炎・虫さされに

オノフェα

第Ⅱ類医薬品



オノフェαは皮膚の炎症をおさえる酢酸デキサメタゾンに、かゆみをおさえるジフェンヒドラミン塩酸塩、患部に清涼感をもたらす*l*-メントール、*dl*-カンフル、かゆみをしずめるクロタミトン、殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールを配合した外用クリーム剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい

水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部

2. 長期連用しないで下さい



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

かゆみ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、ただれ、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ

【用法用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

●用法用量に関連する注意

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)本剤は外用にのみ使用してください。

【成分分量】 100g中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
酢酸デキサメタゾン	0.025g	ぶりかえすかゆみやはれ・赤み等のもととなる炎症を抑えます。
ℓ-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dℓ-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
クロタミトン	5.0g	かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、ステアリルアルコール、セタノール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、エデト酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、ジイソプロパノールアミンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)使用後は必ずキャップを十分にしめてください。
- (2)高温・直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00~PM5:00

(ただし、土、日、祝日を除きます。)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1189-142