


ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

湿疹・皮膚炎・虫さされに

オノフェα

第2類医薬品



オノフェαは皮膚の炎症をおさえるデキサメタゾン酢酸エステルに、かゆみをおさえるジフェンヒドラミン塩酸塩、患部に清涼感をもたらす*l*-メントール、*dl*-カンフル、かゆみをしずめるクロタミトン、殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールを配合した外用クリーム剤です。

⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

かゆみ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ

【用法用量】



1日数回、適量を患部に塗布してください。

●用法及び用量に関連する注意

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。

(1→2)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。

折り曲げないでください。

折りたたまないでください。



【成分分量】 100g中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	ぶりかえすかゆみやはれ・赤み等のもととなる炎症を抑えます。
ℓ-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dℓ-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
クロタミトン	5.0g	かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、ステアリルアルコール、セタノール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、エデト酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、ジイソプロパノールアミンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)使用後は必ずキャップを十分にしめてください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00～PM5:00 (ただし、土、日、祝祭日を除きます。)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142