

ワードケア®
ハンドローション0.2%

開封日 年 月 日

第2類医薬品

第2類医薬品

速乾性手指消毒薬
ワードケア®
ハンドローション0.2%

500mL

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管すること。
- 2.小児の手の届かない所に保管すること。
- 3.他の容器に入れかえないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 4.火気に近づけないこと。
- 5.本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- 6.使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間9:00～17:00
(土、日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931(フリーダイヤル)



ポンプ:PP
ボトル:PE
ラベル:PS

0.2%

速乾性手指消毒薬
ワードケア®
ハンドローション0.2%

500mL



Wardcare®
Hand Lotion 0.2%
クロルヘキシジン製剤
アルコール類 (エタノール)
水溶性 危険等級II 火気厳禁



0.2%



製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

技術提携
丸石製薬株式会社

ワードケア®
ハンドローション0.2%

第2類医薬品

速乾性手指消毒薬
ワードケア®
ハンドローション0.2%

500mL

【使用上の注意】

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)
- 1.次の人は使用しないこと
手指の皮膚に治療を受けている人。
 - 2.次の部位には使用しないこと
(1)損傷のある皮膚。
(2)目の周囲、粘膜等。
(局所刺激作用があります。)

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

0.2%

ワードケア®
ハンドローション0.2%

第2類医薬品

速乾性手指消毒薬
ワードケア®
ハンドローション0.2%

500mL

【効能・効果】

手指の消毒

【用法・用量】

そのまま手指に塗布又は塗擦

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 2.目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 3.外用にのみ使用すること。
- 4.血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。

【成分】

本剤100mL中、クロルヘキシジングルコン酸塩0.2gを含む。添加物としてプロピレングリコール、濃グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、pH調整剤、その他3成分を含む。

0.2%