

第3類医薬品

日本薬局方

ベンザルコニウム塩化物液

*2012年8月改訂

ご使用前にラベルをよく読み正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるよう保管して下さい。

殺菌消毒剤

日本薬局方

ベンザルコニウム塩化物液
クレミール®(サンケミファ)

(逆性石ケン液)

10w/v%

必ずうすめて使用すること

△【使用上の注意】

※ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. 原液のまま使用しないこと。
2. 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿に浸して貼付しないこと。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状、(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

- (2) 患部が広範囲の人。
- (3) 深い傷やひどいやけどの人。
- (4) 医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ等

【効能・効果】

○手指・創傷面の殺菌・消毒

○口腔内の殺菌・消毒

【用法・用量】

本剤を次のように水で希釈して、塗布又は洗浄する。

○手指の殺菌・消毒の場合：

ベンザルコニウム塩化物として0.05～0.1%
(本剤の100～200倍液)

○創傷面の殺菌・消毒の場合：

ベンザルコニウム塩化物として0.01～0.025%
(本剤の400～1,000倍液)

○含嗽の場合：

ベンザルコニウム塩化物として0.005～0.01%
(本剤の1,000～2,000倍液)

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法、用量を守ること。
2. 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗い流すこと。
3. 原液又は濃厚液が目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
5. 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。
6. 外用にのみ使用し、内服しないこと。

【成分及び分量】

ベンザルコニウム塩化物 10w/v%水溶液

【保管及び取扱上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
3. 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
4. 皮革製品に付着した場合は、変質させることがあるので注意すること。
5. 染色した布地は退色することがあるので注意すること。

【その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用法】

1. 食器・器具類の消毒

茶碗、皿、コップ、ナイフ、包丁類、調理器具等は水洗いした後、本剤の200～500倍液に5分間以上浸した後水洗いする。

2. 家屋、乗物等の消毒

床、畳、家具、調度品、手洗い場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機等は、本剤の200～500倍液で清拭するか、又は噴霧する。

3. ごみ箱、冷蔵庫の消毒

本剤の100～200倍液を噴霧する。

4. その他

食品工場、清涼飲料水工場、缶詰・製菓工場の施設、器具の消毒には本剤の200～500倍を用いる。

製造販売元

サンケミファ株式会社

仙台市青葉区芋沢字大竹新田8-1

お客様相談室 TEL (022) 394-3031

副作用被害救済制度 TEL0120-149-931

JAN



4 987468 104197

* GS1-RSS



(01)14987468104194

製造番号

使用期限

18L

キャップ：PP
内袋：PE