

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ジーフォーL軟膏は…

きれ痔・さけ痔・いぼ痔に ジーフォーL軟膏

プレドニゾロン酢酸エステル配合

- プレドニゾロン酢酸エステルが痔のかゆみやはれ・出血にすぐれた効果をあらわします。
- 痛みを抑える局所麻酔薬リドカイン、細菌感染を防ぐ塩化セチルピリジニウムを配合しています。
- 痔疾患に伴うかゆみを抑えるクロルフェニラミンマレイン酸塩、血管収縮させ、はれ・出血を抑えるナファゾリン塩酸塩を配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

- (2) 10日間位使用しても症状がよくなる場合



〔効 能〕

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

〔用法・用量〕


1日3回、適量を肛門部に塗布します。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

〈チューブの穴の開け方〉

1. キャップをはずします。
2. 突起部がある方をチューブの先端口に強く押し当てて穴を開けてください。
3. キャップを元にもどし、ワンタッチキャップとしてお使いください。



〔成分・分量と働き〕1g中

成 分	分 量	働 き
ブレドニゾン酢酸エステル	1mg	患部のかゆみやはれ・出血を抑えます。
リドカイン	30mg	患部の痛みやかゆみを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg	患部のかゆみを抑えます。
アラントイン	10mg	粘膜の修復を助けます。
トコフェロール酢酸エステル	30mg	肛門周囲の血行を促進し、患部のうっ血(血がとどこおること)を改善します。
塩化セチルピリジニウム	2mg	傷口への細菌感染を防ぎます。
ナファゾリン塩酸塩	0.3mg	血管を収縮させ、はれ・出血を抑えます。

添加物として、スクワラン、セタノール、ワセリンを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



◎早くよくなっていたいただくためのアドバイス

肛門の周囲には細い静脈が網の目のように入り組んでいます。この静脈の血液の流れが悪くなると、うっ血やはれが起こります。また、排便などの刺激で出血、痛み、かゆみなどを起こします。

1. 硬い便は肛門に傷をつけたり、出血や脱肛の原因となりますから、食事に注意し、便秘にならないように心がけてください。
2. ぬれたガーゼで拭く、こまめに入浴をするなど、患部を常に清潔に保つように心がけてください。
3. 座る、かがむなど患部にうっ血を起こしやすい姿勢を長く続けないでください。
4. お酒や香辛料の入った食べ物、タバコなどはなるべくさけるようにしてください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお問い合わせください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号