

解熱鎮痛薬

メディスク

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるように大切に保管してください。

痛みや熱は、からだの異常を知らせる合図です。しかし、がまんできないものは苦痛であるとともに、日常生活にも支障をきたします。アスピリンはこうした痛みや熱に優れた効果を発揮し、症状を鎮めます。メディスクは、このようなアスピリンの効果を高めるために、胃への負担を緩和し有効成分の吸収を早める合成ヒドロタルサイトを配合しました。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用時は飲酒しないでください

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍



2. 次の場合は、ただちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合はただちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸痛しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

裏面もお読みください。

【効能・効果】

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

【用法・用量】

なるべく空腹時をさけて服用し、服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15歳以上）	2錠	2回を限度とする。
15歳未満	服用しないでください。	



<用法・用量に関連する注意>

（1）用法及び用量を厳守してください。

（2）錠剤の取り出し方。

下図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

（誤ってPTPシートをそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



<PTPシートの取り出し図>

【成分・分量とその主な作用】

成 分	1日量(4錠)中	主 な 作 用
アスピリン(アセチルサリチル酸)	1320mg	鎮痛・解熱作用
合成ヒドロタルサイト	400mg	胃粘膜保護作用

添加物としてタルク、トウモロコシデンプン、マクロゴール、酸化チタン、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、無水ケイ酸、青色1号を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。


（2）小児の手の届かない所に保管してください。

（3）他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わります。）

（4）PTPシートを切り離すときは、変質の原因となりますので、服用しない本剤の裏面のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。

（5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

ホーユー株式会社 お客様相談室

電話：（052）935-9941

受付時間：土・日・祝日及び弊社休業日を除く午前9時～午後5時