

MACH II TABLETS

かぜぐすり

マッハⅡ

TRADE MARK



第②類医薬品

発売 仁生薬品株式会社
富山県滑川市堀江636

®

第②類医薬品

かぜぐすり マツハ II

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

15才以上（大人） 1回2錠
7才以上15才未満 1回1錠
1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

成分・分量 1日量(6錠)中

アセトアミノフェン 900mg
クロペラスチン塩酸塩 48mg
無水カフェイン 75mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルクを含有します。その他の添加物成分は、添付文書をご覧ください。

6錠

注意 (非ピリン系)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 服用に際しては、添付文書をよくお読みください。
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
6. 小児の手の届かない所に保管してください。
7. 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元 中新薬業株式会社
富山県滑川市上小泉504-2

お客様相談室 電話076(475)2121

品目番号 78-492



袋



中袋:PE
セロハン

使用期限

NK-JA

かぜ薬(錠剤用)

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります)
4. 服用前後は飲酒しないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人
- (3)授乳中の
人
- (4)高齢者
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6)次の症状のある人
高熱、排尿困難
- (7)次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出来る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数	年齢	1回量	1日服用回数
15才以上(大人)	2錠	3回	7才未満	服用しないこと	
7才以上15才未満	1錠				

食後なるべく30分以内に服用して下さい。

<用法・用量に関する注意>

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量(6錠)中

アセトアミノフェン···900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩···7.5mg

クロペラスチン塩酸塩···48mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩···60mg

無水カフェイン···75mg

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、セルロース、メチルセルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴル、カルナウバロウを含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先 中新薬業株式会社 お客様相談室

電話 076(475)2121

受付時間 9:00~16:00(土、日、祝日を除く)



製造販売元 中新薬業株式会社 富山県滑川市上小泉504-2