

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。裏面の用法・用量に関連する注意をよくお読みください。

第3類医薬品

口腔咽喉薬

のどの痛み・はれ、声がれ、口臭の除去に **トピックAZトローチ**

トピックAZトローチは、抗炎症剤 アズレンスルホン酸ナトリウム・グリチルリチン酸二カリウムと殺菌剤 セチルピリジニウム塩化物水和物を配合したトローチ剤です。
のどの炎症による次の症状：声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれの改善、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去に効果がみられます。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

【用法・用量】

次の1回量を、口の中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1 回量	1 日使用回数
15歳以上	1 錠	4～6 回
5 歳以上15歳未満		2～3 回
5 歳未満	使用しないでください	

裏面も必ずお読みください

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
- (4)本剤は5歳未満の乳幼児には使用させないでください。
- (5)トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなどの思わぬ事故につながります。)



【成分・分量と作用】

1錠(1.2g)中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.8mg	口腔内の炎症組織に直接作用し、炎症を抑制します。
グリチルリチン酸二カリウム	2.5mg	抗炎症作用により、口腔内の炎症を抑制します。
セチルピリジニウム塩化物水和物	1 mg	殺菌作用をもち細菌の感染を予防します。

添加物として、精製白糖、粉末還元麦芽糖水アメ、ポビドン、マクロゴール6000、炭酸水素ナトリウム、1-メントール、ステアリン酸カルシウム、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)アルミ袋を開封し、日数を経ると、光や熱、湿気により変色することがあります。ご使用の残りは保管方法に注意し、変色したものは使用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)本剤に添加されている1-メントールが、温度変化等により綿状又は繊維状に析出する場合がありますが、品質には問題ありません。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

☎0120-415-688

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1