

販売名：ペアコールトローチAZ

使用に際しては、説明書きをよくお読みください。

## 第3類医薬品

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

#### 【効能・効果】

- のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
- 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

#### 【用法・用量】

次の1回量を、口中に含み、かますにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1回量	1日使用回数
15歳以上	1錠	4~6回
5歳以上15歳未満		2~3回
5歳未満		使用しないでください

#### 〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用せる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- (3) 本剤はトローチ剤ですので、かみ碎いたり、のみ込んだりしないでください。
- (4) 本剤は5歳未満の乳幼児には使用させないでください。
- (5) トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなどの思わぬ事故につながります。) PTPシート取り出し図



#### 【成分・分量】

1錠(1.2g)中に次の成分を含有しています。  
アズレンスルホン酸ナトリウム 0.8mg、グリチルリチン酸二カリウム 2.5mg、セチルピリジニウム塩化物水和物 1mg  
添加物として、精製白糖、粉末還元麦芽糖水アメ、ポビドン、マクロゴール6000、炭酸水素ナトリウム、I-メントール、ステアリン酸カルシウム、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール、香料を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります。)
- (4) アルミ袋を開封し、日数を経ると、光や熱、湿気により変色することがあります。ご使用の残りは保管方法に注意し、変色したものは使用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 本剤に添加されているI-メントールが、温度変化等により綿状又は繊維状に析出する場合がありますが、品質には問題ありません。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



使用期限 製造番号

00120-415-688 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日除く)



滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1  
新薬品工業株式会社

製造販売元