

開豊瓊玉膏

【複方地黄人參羔】

医薬品

【製品の特徴】 瓊玉膏は生地黄の搾汁、人參末、ブクリョウ末、枸杞子末、沈香末、ハチミツを混合し、二重蒸気釜で72時間加熱したのち、徐々に冷却させて製品としました。

瓊玉膏は、黒褐色、軟エキスの独特の香りを持ち、甘味と多少の苦味を持った生薬製剤です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 血圧の高い人又は高齢者。
 - (4) 心臓又は腎臓に障害のある人。
 - (5) むくみのある人。
 - (6) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位服用しても症状の改善がみられない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

下痢

【効能・効果】

次の場合の滋養強壮
食欲不振、肉体疲労、虚弱体質、病後の体力低下、胃腸虚弱、血色不良、冷感性、発育期

【用法・用量】

成人……………茶匙 1杯量(約5g)
 11才以上15才未満……………茶匙 2/3量
 8才以上11才未満……………茶匙 1/2量
 8才未満の小児……………服用しないこと
 そのまま、または温湯でうすめて1日1～2回服用する。
 なお、添付の茶匙すりきり1杯で約5gです。

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤の特性上、製品により色、味、固さに多少の差異を生じることがありますが、効能・効果に変わりありません。よくかきまぜてから服用してください。

【成分・分量】

本品100g中
 生地黄の搾汁……………32.0g
 人參末……………2.8g
 ブクリョウ末……………8.0g
 枸杞子末……………0.9g
 沈香末……………0.1g
 ハチミツ……………38.5g
 添加物としてパラオキシ安息香酸プロピルを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 服用に使用した茶匙は、清潔に保つようしてください。
5. 服用後のビンには、割れることがありますので熱いお湯で洗わないでください。

【消費者相談窓口】

株式会社 栃本天海堂 DI室
 〒530-0016 大阪市北区中崎1丁目3番27号
 電話番号 06(6372)6395
 受付時間 10時～17時(土、日、祝日を除く)

【製造販売元】

株式会社 栃本天海堂
 大阪市北区末広町3番21号

【製 造 元】 廣東製藥株式會社
 (大韓民国)