

開豊瓊玉膏

【複方地黄人參羔】

第2類医薬品

【製品の特徴】 瓊玉膏は生地黄の搾汁、人參末、ブクリョウ末、枸杞子末、沈香末、ハチミツを混合し、二重蒸気釜で蒸熟したのち、徐々に冷却させて製品としました。

瓊玉膏は、黒褐色、軟エキス様の独特の香りを持ち、甘味と多少の苦味を持った生薬製剤です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヶ月位服用しても症状の改善がみられない場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

下痢

【効能・効果】 次の場合の滋養強壮

食欲不振、肉体疲労、虚弱体質、病後の体力低下、胃腸虚弱、血色不良、冷え性、発育期

【用法・用量】 成人 …………… 茶匙 1杯量(約5g)

11才以上15才未満 …………… 茶匙 2/3量

8才以上11才未満 …………… 茶匙 1/2量

8才未満の小児 …………… 服用しないこと

そのまま、または温湯ですすめて1日1～2回服用する。

なお、添付の茶匙すりきり1杯で約5gです。

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤の特性上、製品により色、味、固さに多少の差異を生じることがありますが、効能・効果に変わりありません。よくかきまぜてから服用してください。

【成分・分量】 本品100g中

生地黄の搾汁 …………… 32.0g

枸杞子末 …………… 0.9g

人參末 …………… 2.8g

沈香末 …………… 0.1g

ブクリョウ末 …………… 8.0g

ハチミツ …………… 38.5g

添加物としてパラオキシ安息香酸プロピルを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 服用に使用した茶匙は、清潔に保つようにしてください。
5. 服用後のビンは、割れることがありますので熱いお湯で洗わないでください。

【お客様相談窓口】

株式会社 栃本天海堂 DI室
 電話番号 06-6312-9090
 メールアドレス customer@tochimoto.co.jp
 受付時間 10時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

【製造販売元】

株式会社 栃本天海堂
 大阪市北区末広町3番21号

【製

造】 廣東製藥株式會社
 大韓民国製