

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

サンツール®温パップEx (外用鎮痛消炎薬)

特長

トウガラシエキ스가局所の血管を上げ、トコフェロール酢酸エステルが末梢の血行をよくします。適度の温感刺激と鎮痛効果により、肩こり、腰痛、関節痛などの慢性の症状にすぐれた効果を発揮します。

△使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

第3類医薬品

1枚: 10cm × 14cm

30枚入

効能・効果

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量をお守りください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4) 患部が汗等で濡れている時は、よく拭いてください。(5) 打撲、捻挫には、はれがひいてから使用してください。(6) 入浴の1時間前には、はがしてください。また入浴後は30分位してから使用してください。(7) 薬剤にふれた手指はよく洗ってください。

成分・分量 <膏体100g (1000cm²)中>

サリチル酸グリコール	1.5g	炎症を抑えます
dl-カンフル	0.5g	痛みをやわらげます
トウガラシエキス	0.1g (日局トウガラシ1.25g相当量)	局所の血管を上げ、血行をよくします
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	末梢の血行をよくします
ジフェニヒドラミン塩酸塩	0.05g	かゆみの発生を抑えます
添加物:ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースナトリウム、pH調節剤、赤色106号、その他2成分 含有		

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4) 未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めてください。使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ここを押して
開けてください。

製造販売元: 東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

発売元: 株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

商品詳細へ



使用期限

製造番号

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

