

服用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

第3類医薬品

関節痛・神経痛・腰痛に

アスラック®


ビタミンB₁主薬製剤

〔アスラックの特徴〕


1. 1日量としてコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを900mg配合しました
2. 吸収のよいフルスルチアミン塩酸塩をはじめ、ビタミンB群を配合したビタミンB₁主薬製剤です



関節痛



神経痛



腰痛



〔使用上の注意〕



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、口内炎

- (2) 1か月位服用しても症状がよくならない場合

2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください

軟便、下痢

〔効能〕

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
 - 脚気
- 「ただし、これらの症状について、1か月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師にご相談ください」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔用法・用量〕

次の量を、水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1カプセル	3回 (朝昼晩)
15歳未満	服用しないこと	

用法・用量を厳守してください

〔成分・分量〕

本剤は、淡黄色のカプセルで、3カプセル中に次の成分を含有する

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム…………… 900mg
 フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB₁誘導体)…………… 25mg
 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)…………… 25mg
 リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル) …… 10mg
 シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) …………… 0.06mg

添加物:セルロース, 部分アルファー化デンプン, ヒドロキシプロ
 ピルセルロース, ステアリン酸Mg, 黄色5号, カラギーナン, ソ
 ルビタン脂肪酸エステル

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり, 品質が変わる)
- (4) 容器内の詰め物は, 輸送中のカプセル破損防止用ですので, 開封後は捨ててください
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

本品についてのお問い合わせは, お買い求めのお店, または下記にお願い致します

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03(6667)3232

受付時間 9:00~17:00(土, 日, 祝日を除く)

® 登録商標



製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
 東京都中央区日本橋小網町1-8