

第3類医薬品

関節痛・神経痛・腰痛に

アスラック


ビタミンB₁主薬製剤

アスラックの特徴


1. 1日量としてコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを900mg配合しました。
2. 吸収のよいフルスルチアミン塩酸塩をはじめ、ビタミンB群を配合したビタミンB₁主薬製剤です。



関節痛



神経痛



腰痛



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

軟便、下痢

3. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効 能・効 果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気
- 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用 法・用 量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1カプセル	3回（朝昼晩）
15歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守して下さい。

成 分・分 量

本剤は、淡黄色のカプセルで、3カプセル中に次の成分を含有します。

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・・・・・・・・・・900mg
フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB₁誘導体）・・・・・・・・25mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）・・・・・・・・・・25mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB₂酪酸エステル）・・・・10mg
シアノコバラミン（ビタミンB₁₂）・・・・・・・・・・0.06mg
添加物：セルロース、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、
ステアリン酸Mg、黄色5号、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステル

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) ビンの中の詰め物は輸送中のカプセル破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03(5205)8331

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

®登録商標



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10