



* 0 9 0 4 A 0 2 *

2009年4月改訂 第2版

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

口腔内消炎剤

**パープル
ショットC**



有効成分「アズレンスルホン酸ナトリウム」がのどの炎症部に直接作用して、のどの痛みやはれの原因である炎症を抑えます。また、口内の炎症である口内炎にも効果があります。

- のどのイガイガやハレに
- プールの後の不快感に
- さっぱりとした使用感

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 口中のただれがひどい人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

- (2) 症状が悪化した場合。
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】 のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎。


【用法・用量】 1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉


- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルを患部に付けて、「アー」と声を出しながら、2～3回噴射してください。
- (3)塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

〈使用方法〉


①容器のフタをはずしてください。



②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2～3回直射してください。
※最初は薬液が出るまで4～5回押してください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。
※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため、清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



【成分及び分量】(本剤 1mL中)

アズレンスルホン酸ナトリウム(水溶性アズレン)……………0.2mg

※添加物として、塩化セチルビリジニウム、グリセリン、還元麦芽糖水アメ、クエン酸、クエン酸 Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH 調整剤、香料を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4)薬液が衣服等に付着すると着色します。なお、付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。
- (6)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

【お問い合わせ先】

本製品について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元

白金製薬株式会社

〒634-0803奈良県橿原市上品寺町515

製造販売元

ダイヤ製薬株式会社

〒634-0803奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)