

胃痛・胃もたれに

胃粘膜保護修復成分・生薬配合 胃腸薬

タフクール

タフクールは、胃腸の不快症状にすぐれた効果を発揮するように、それぞれの有効成分の特性を考えて配合し、のみやすい顆粒とした胃腸薬で、次のような特長があります。

1. 胃痛、胸やけなどの過酸症状の改善に、3種類の制酸剤とロートエキスを配合しています。
2. 荒れた胃粘膜の修復のために、2種類の胃粘膜修復剤を配合しています。
3. 胃もたれ、消化不良などの改善に2種類の消化酵素を配合しています。
4. ケイヒとカンゾウの2種類の生薬を配合したのみやすい顆粒です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して、乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は、服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化不良、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振、胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感、胃痛、胸やけ、胸つかえ、胃酸過多、げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐

用法・用量

次の量を1日3回食後または食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
(大人)15才以上	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

用法・用量を厳守してください。

成分・分量

本剤は、3包(1日量)中に次の成分・分量を含んでいます。 ※1包は1.2g入です。

成 分	分 量	作 用
水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物	900mg	過剰な胃酸を中和し、胃痛、胸やけなどの過酸症状を改善します。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	300mg	
沈降炭酸カルシウム	450mg	胃酸の分泌を抑え、胃痛をしずめます。
ロートエキス5倍散(ロートエキスとして30mg)	150mg	
カンゾウ末	240mg	あれた胃粘膜を修理・修復します。
ケイヒ末	200mg	弱った胃腸の働きを活発にします。
ビオチン	30mg	糖質、たんぱく質を消化します。
リパーゼAP6	45mg	脂肪を消化します。
アルジオキサ	150mg	あれた胃粘膜を修復するとともに保護します。

添加物：D-マンニトール、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロース、乳糖水和物、ポビドン、トメントール、デキストリン、軽質無水ケイ酸、エタノール、プロピレングリコール、香料

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



発 売 元 興 和 株 式 會 社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造販売元 共栄製薬工業株式会社 富山県高岡市中田4576番地