

第2類医薬品

胃痛・胃もたれに

胃粘膜保護修復成分・生薬配合 胃腸薬

タフクール

タフクールは、胃腸の不快症状にすぐれた効果を発揮するように、それぞれの有効成分の特性を考えて配合し、のみやすい顆粒とした胃腸薬で、次のような特長があります。

1. 胃痛、胸やけなどの過酸症状の改善に、3種類の制酸剤とロートエキスを配合しています。
2. 荒れた胃粘膜の修復のために、2種類の胃粘膜修復剤を配合しています。
3. 胃もたれ、消化不良などの改善に2種類の消化酵素を配合しています。
4. ケイヒとカンゾウの2種類の生薬を配合したのみやすい顆粒です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化不良、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振、胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感、胃痛、胸やけ、胸つかえ、胃酸過多、げっぷ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐

用法・用量

次の量を1日3回食後又は食間に水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

- 食間とは「食事と食事の間」のことで、たとえば朝食と昼食の間のことをさします。食事中に服用するということではありません。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

成分・分量

本剤は、3包中に次の成分・分量を含んでいます。※1包は1.2g入です。

成分	分量	作用
水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物	900mg	過剰な胃酸を中和し、胃痛、胸やけなどの過酸症状を改善します。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	300mg	
沈降炭酸カルシウム	450mg	胃酸の分泌を抑え、胃痛をしずめます。
ロートエキス5倍散（ロートエキスとして30mg）	150mg	
カンゾウ末	240mg	あれた胃粘膜を修理・修復します。
ケイヒ末	200mg	弱った胃腸の働きを活発にします。
ジオダスターゼ2000	30mg	糖質、たんぱく質を消化します。
リパーゼAP6	45mg	脂肪を消化します。
アルジオキサ	150mg	あれた胃粘膜を修復するとともに保護します。

添加物：D-マンニトール、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロース、乳糖水和物、ポビドン、L-メントール、デキストリン、軽質無水ケイ酸、エタノール、プロピレングリコール、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造販売元 株式会社バナケイア製薬 富山県高岡市中田4576番地