

## 胃痛・胃もたれに

胃粘膜保護修復成分・生薬配合 胃腸薬

## タフクール

タフクールは、胃腸の不快症状にすぐれた効果を発揮するように、それぞれの有効成分の特性を考えて配合し、のみやすい顆粒とした胃腸薬で、次のような特長があります。

1. 胃痛、胸やけなどの過酸症状の改善に、3種類の制酸剤とロートエキスを配合しています。
2. 荒れた胃粘膜の修復のために、2種類の胃粘膜修復剤を配合しています。
3. 胃もたれ、消化不良などの改善に2種類の消化酵素を配合しています。
4. ケイヒとカンゾウの2種類の生薬を配合したのみやすい顆粒です。

## ▲使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
- ② 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
- ③ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
- ④ 長期連用しないでください



## 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。  
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、便秘、下痢
- ④ 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

## 効能・効果

食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化不良、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振、胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感、胃痛、胸やけ、胸つかえ、胃酸過多、げっぷ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐

## 用法・用量

次の量を1日3回食後又は食間に水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満の小児	×服用しないこと	

- 食間とは「食事と食事の間」のことで、たとえば朝食と昼食の間のことをさします。食事中に服用するというものではありません。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

## 成分・分量

本剤は、3包中に次の成分・分量を含んでいます。※1包は1.2g入です。

成分	分量	作用
水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物	900mg	過剰な胃酸を中和し、胃痛、胸やけなどの過酸症状を改善します。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	300mg	
沈降炭酸カルシウム	450mg	
ロートエキス3倍散（ロートエキスとして30mg）	90mg	胃酸の分泌を抑え、胃痛をしずめます。
カンゾウ末	240mg	あれた胃粘膜を修理・修復します。
ケイヒ末	200mg	弱った胃腸の働きを活発にします。
ビオザアスターゼ2000	30mg	糖質、たんぱく質を消化します。
リパーゼAP6	45mg	脂肪を消化します。
アルジオキサ	150mg	あれた胃粘膜を修復するとともに保護します。

添加物：D-マンニトール、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロース、乳糖水和物、ポビドン、L-メントール、デキストリン、軽質無水ケイ酸、エタノール、プロピレングリコール、香料

## 保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- ④使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

### 本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



発売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
製造販売元 株式会社パナケイア製薬 〒939-1275 富山県高岡市中田4576番地