

太田胃散〈内服液〉S

指定医薬部外品

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。医師の治療を受けている人。
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4



使用  
期限

製造  
番号

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 開栓されている製品は服用しないでください。開栓後は保存しないでください。

ガラス:瓶 金属:キャップ

# 太田胃散

## 〈内服液〉S

ムカムカに  
スツクリ  
味

飲みすぎ  
二日酔のむかつき  
食べすぎ

食前・食後・就寝前に



太田胃散 50mL

指定医薬部外品

効能・効果

飲みすぎ又は食べすぎによる胃部不快感及びはきけ（二日酔・悪酔いのむかつき、胃のむかつき、悪心）

用法・用量

成人（15歳以上）1日1回、1本を食前、食後又は就寝前に服用してください。15歳未満は服用しないでください。※生薬成分を含むため、沈殿を生じることがありますが、品質に影響はありません。よく振ってから服用してください。

成分 1日量（50mL）中

ホップ流エキス0.17mL（ホップとして170mg）、ケイヒ流エキス0.25mL（ケイヒとして250mg）、ウイキョウ流エキス0.15mL（ウイキョウとして150mg）、チョウジエキス606mg（チョウジとして200mg）、チンピエキス50mg（チンピとして250mg）、ショウキョウ流エキス0.25mL（ショウキョウとして250mg）、カンゾウ抽出物10.5mg（カンゾウとして150mg）、カルニチン塩化物160mg

〔添加物〕*l*-メントール、安息香酸Na、バラベン、エタノール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調整剤、香料、白糖

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」

☎ (03) 3944-1311 (代表)

受付時間 9:30～17:00 (土、日、祝日等を除く)

発売元

株式会社 太田胃散

東京都文京区千石2-3-2

<https://www.ohta-isan.co.jp/>

製造販売元

日新薬品工業株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町田渚野80-1