

ご使用の前に必ずこの添付文書をお読み下さい
必要なときにすぐ読めるよう保管して下さい

殺虫剤

第 2 類医薬品

ミラケン®PY

製品の特徴

本剤は、有効成分として総ピレトリンを 1% となるジョチュウギクエキスを含有し、希釈剤液化二酸化炭素を残量とする業務用殺虫剤です。容器内は液化高压ガスで圧力が高いため、使用及び取扱いには十分に注意して下さい。

⚠ 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

1. 害虫駆除業者以外は使用しないこと。
2. 人体に向かって噴霧しないこと。又、噴霧薬剤を吸入しないこと。
3. 噴霧する人は保護具（防じんマスク、保護メガネ、長袖の作業衣、手袋など）を着用すること。
4. 噴霧中の部屋には噴霧する人以外は立ち入らないこと。
5. 使用開始後 4 時間を経過しないうちに入室しないこと。
6. 4 時間経過後、室内の空気を 1 時間以上十分な換気を行った後入室すること。
7. 入室後に換気をしないでそのままに放置しないこと。



相談すること

1. アレルギー体質の人は、使用前に医師に相談すること。
2. 噴霧中又は噴霧後、万一体に異常が起きた場合は、すぐに本品がジョチュウギクエキスの殺虫剤であることを医師に告げて診察を受けること。

保管及び取扱上の注意

1. 保管上の注意
 - 1) 子供の手の届かないところに保管すること。
 - 2) 容器は直射日光を避け、通気換気のよいところに保管し、なるべく 30℃ 以下に保つこと。
 - 3) 容器は転倒、転落しないようロープ等で固定すること。
 - 4) 容器は充填容器と空容器に区分して保管すること。
2. 使用に際しての注意
 - 1) 定められた用法用量を厳守すること。
 - 2) 容器は必ず直立させ、30℃ 以下で使用する。
 - 3) 噴霧する際は扉、窓等を閉め、開口部は目張り等を行い気密にし、外部への漏洩を防止すること。
 - 4) 使用に際しては、部屋の大きさに応じて、噴霧時間を変え、台秤等で使用前後の重量を測定し、噴霧量を調整すること。
 - 5) 薬剤を噴霧の際は、部屋の入口から使用しないこと（奥の方から使用すること）。
 - 6) 薬剤噴霧により煙感知器が作動することがあるので注意すること。

- 7) 本剤は液化ガスのため、容器内が全てガス化した時点では正常な濃度が得られませんので注意すること。
（本剤の使用可能な量は、28kg 入りで約 23kg、7kg 入りで約 6kg、2.4kg 入りで約 2.0kg、1kg 入りで約 0.8kg までとすること）

3. その他の注意

- 1) 薬剤が皮膚についたときは石鹸と水でよく洗う、眼に入ったときは直ちに水でよく洗い流すこと。
- 2) 飲食物、食器又は飼料に直接かけないこと。
- 3) 観賞魚、ペット類、魚類にはかけないこと。また、施工時は部屋の外に出すこと。
- 4) 噴霧終了後は速やかに室外に出て、少なくとも 4 時間は入室しないこと。
- 5) 入室する際は、室内の空気を外気と良く交換すること。
- 6) 集合住宅等の集中管理方式のガス警報器の場合は、住宅管理者などに連絡して使用すること。また、ガス漏れ警報器は噴霧薬剤に反応することがあるので注意すること。
- 7) 使用後の容器は容器所有者（メーカー）に返却すること。

効能・効果

- ハエ成虫、カ成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ（ナンキンムシ）及びイエダニの駆除。

用法・用量

- 噴霧するときは容器バルブに噴霧用のノズルを取り付け、容器のバルブを開いて密閉した室内空間中に噴霧すること。
- ハエ成虫及びカ成虫に対して 1m³につき 1g の割合で噴霧し、噴霧後 30 分間部屋を閉めておくこと。
 - ゴキブリ、ノミ、トコジラミ（ナンキンムシ）及びイエダニに対して 1m³につき 5g の割合で噴霧し、噴霧後 4 時間部屋を閉めておくこと。

成分・分量

本剤 1000g 中、ジョチュウギクエキス（総ピレトリン）10g を含む。

包装

耐圧金属製密封容器（高压ガス容器）

お客様相談窓口

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-16-7 大陽日酸新橋ビル
日本液炭株式会社 ガス営業部
TEL (03) 3500-0711(代) FAX (03) 3500-0780
9:00~17:50（平日）

製造販売元 日本液炭株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-16-7 大陽日酸新橋ビル