



A-coop クミアイ

第2類医薬品

新胃腸薬「細粒」

複合胃腸薬

特徴

クミアイ 新胃腸薬「細粒」は、消化・制酸・健胃・胃粘膜修復・鎮痛鎮痙といった様々な作用をもつ13種類の成分をバランスよく配合した複合胃腸薬です。

○消化力の強い2つの消化酵素が食べ過ぎや消化不良、胃もたれにすぐれた効き目を発揮します。さらに、ウコンとウルソデオキシコール酸が胆汁の分泌を促し、脂肪の消化を助けます。

○速効性と持続性の制酸薬が、胸やけやげっぷなどの胃酸の出過ぎによる症状を改善します。

○胃粘膜修復作用をもつ成分が、傷んだ胃粘膜を保護・修復します。

○溶けやすい細粒剤で、スッキリとした服用感です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

透析療法を受けている人

2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人

(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 次の診断を受けた人：腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合

効能・効果

消化不良、消化促進、食欲不振（食欲減退）、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃部・腹部膨満感、胃酸過多、胸やけ、胸つかえ、胃もたれ、胃部不快感、胃重、胃痛、胃弱、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐

用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 の服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
11歳～14歳	2/3 包	
8 歳～10歳	1/2 包	
5 歳～7 歳	1/3 包	
3 歳～4 歳	1/4 包	
3 歳未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

成分・分量

1 日 量（3 包） 中

成 分	含 量	は た ら き
ビオチン	90 mg	炭水化物やたんぱくなどに幅広い消化力を発揮する消化酵素です。
リパーゼ	60 mg	脂肪の消化・吸収を促進する消化酵素です。
ウルソデオキシコール酸	30 mg	胆汁の分泌を促し、脂肪の消化・吸収を促進します。むかつきや嘔気、悪酔いなどにもすぐれた効果があります。
炭酸水素ナトリウム	810 mg	速効性の制酸薬で胸やけ・げっぷなどの不快な症状を速やかに解消します。
炭酸マグネシウム	450 mg	持続的に胃酸を中和する制酸薬です。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	1,200 mg	持続的に胃酸を中和するとともに、胃粘膜を保護します。
ウコン末	210 mg	胆汁の分泌を促して、脂肪の消化を助けるとともに、健胃作用を発揮します。
ウイキョウ末	75 mg	消化液の分泌を促して食欲を増し、弱った胃の働きを高める健胃生薬です。
ケイヒ末	360 mg	
ショウキョウ末	75 mg	
チョウジ末	75 mg	
アルジオキサ	150 mg	粘液の増加を促進し、荒れた胃粘膜を修復するとともに、持続的な制酸作用も発揮します。
カンゾウ末	300 mg	胃壁を保護して、胃の炎症をしずめます。

添加物として、D-マンニトール、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ℓ-メントールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4)使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口
電話：0238-46-2013
〔月～金曜日 9：00～17：00（祝日を除く）〕

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**
製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930