

アレルギー専用点鼻薬

第2類医薬品


花粉、ハウスダスト等による鼻のアレルギー症状に

アスゲン点鼻薬AG

クロモグリク酸ナトリウム配合

- クロモグリク酸ナトリウム（抗アレルギー剤）が肥溝細胞の膜を安定化し、鼻水・鼻づまり等のアレルギー症状を引き起します。アレルギー誘発物質（ヒスタミン等）の放出を抑制します。また、クロルフェニラミンマレイン酸塩（抗ヒスタミン剤）が、ヒスタミンの受容体結合をブロックし、すでに起きました症状を緩和します。さらに、ナファゾリン塩酸塩（血管収縮剤）が、鼻粘膜のはれや充血を抑え、鼻づまり等を緩和します。
- 使い心地がさっぱりとしたクールタイプの点鼻薬です。


アレルギーのメカニズム



アスゲン点鼻薬AGの働き

クロモグリク酸
ナトリウム
<抗アレルギー剤>

肥溝細胞膜を安定化し、
アレルギー誘発物質の
放出を抑制します。



クロルフェニラ
ミンマレイン酸塩
<抗ヒスタミン剤>

ヒスタミンの受容体結
合をブロックし、すで
に起きました症
状を緩和します。

アレルギー
症状の緩和

ナファゾリン塩酸塩
<血管収縮剤>
鼻粘膜のはれや充血を
抑え、鼻づまり等を緩和
します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 使用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください（眠気があらわれることがあります。）
- 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください

- 医師の治療を受けている人。
- 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- 妊娠または妊娠していると思われる人。
- 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

(6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください

- 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	刺激感、鼻出血、はれ
精神神経系	頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに息苦しさ、浮腫（咽喉、まぶた、鼻粘膜、口唇等）、じんましん等の症状があらわれる。

(裏面へ続く)

(2) 3日間使用しても症状がよくならない場合

3. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、医師または薬剤師にご相談ください

《効能・効果》

花粉、ハウスダスト（室内塵）等による次のような鼻のアレルギー症状の緩和：

鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、くしゃみ、頭重（頭が重い）

《用法・用量》

次の量を、両鼻腔内に噴霧してください。


年齢	1回使用量	1日使用回数
成人（15歳以上）		3～5回
7歳～15歳未満	1噴霧ずつ (3時間以上の間隔をあけること)	
7歳未満		使用しないこと

3日間使用しても症状の改善がみられない場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にのみ使用してください。

《使用方法》



《成分・分量と働き》

本剤は、100mL中に次の成分を含有します。

成 分	含 量	働き
クロモグリク酸ナトリウム	1g	アレルギー誘発物質（ヒスタミン、ロイコトリエン等）の放出を抑え、鼻のアレルギー症状を緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.25g	ヒスタミンの受容体結合をブロックし、アレルギーによる、鼻水、鼻づまりを抑えます。
ナファゾリン塩酸塩	0.025g	鼻粘膜のはれや充血を抑え、鼻づまり等を緩和します。

添加物として、エデト酸Na水和物、ベンザルコニウム塩化物、等張化剤、グリセリン、エタノール、pH調節剤、香料を含有します。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

アスゲン製薬株式会社 医薬安全情報課

名古屋市東区泉二丁目28-8 電話：0120-935-758（フリーダイヤル）

受付時間 午前9：00～午後5：00（土、日、祝日を除く）

企画開発発売元



アスゲン製薬株式会社

名古屋市東区泉二丁目28-8

製造販売元



株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地