

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

第2類医薬品

## 漢方薬

# 加味逍遙散エキス細粒「分包」三和生薬

カミショウヨウサン

### 製品の特徴

加味逍遙散は、中国宋時代に著された「和劑局方」<sup>わざいきょくほう</sup>に記載されている漢方処方で、体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向がある場合の、冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症に用いられます。

加味逍遙散エキス細粒「分包」三和生薬は、加味逍遙散をエキス化し、服用しやすい細粒にした製品です。



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 胃腸の弱い人
  - 高齢者
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
むくみ
  - 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

下痢

## 効能・効果

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>、不眠症

### <効能・効果に関する注意>

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

## 用法・用量

1 回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15才以上)	1 包	3 回
15才未満	服用させないで下さい	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用して下さい。

## 成分・分量 (3包 (6g) 中)

加味逍遙散エキス (3/5量) ……2.1g

トウキ……………1.8g	シャクヤク……………1.8g	ビャクジュツ……………1.8g
ブクリョウ……………1.8g	サイコ……………1.8g	カンゾウ……………1.2g
ポタンピ……………1.2g	サンシシ……………1.2g	ショウキョウ……………0.6g
ハッカ……………0.6g		

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがあります。が、効果に変わりはありません。

### お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



ワクナガ

販売元

# 湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>



製造販売元

# 三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地6-1

JB882