

- はがれにくい
- 目立たない
- 伸縮性自在

肩こり

筋肉痛

腰痛

自然な肌色タイプ

消炎鎮痛プラスター剤

サリエスタエース

10枚入

第3類医薬品

7cm×10cm

背割れ付



タテ・ヨコ  
ナナメに  
伸縮自在

発売元



株式会社富士薬品

配置用

ご使用にあたって、この説明書を必ずお読みください。  
必要に応じて読めるように、大切に保管してください。

うちみ・ねんご・肩こり・  
腰痛・筋肉痛・筋肉疲労

### 第3類医薬品

消炎・鎮痛プラスター剤

## サリエスタエース

- ・サリエスタエースは貼った時に冷や〜としない、消炎・鎮痛に優れた効果を発揮するプラスター剤です。
- ・タテ・ヨコ・ナナメに伸縮自在の高密度繊維を使い、関節部位にもびったりフィットします。

#### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

#### 🗨️ 相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本品によりかぶれ等を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【成分・分量】

本品の膏体100g(10000cm<sup>2</sup>)中  
サリチル酸グリコール … 3.0g l-メントール … 6.0g  
ノニル酸ワニルアミド … 0.01g

添加物として流動パラフィン、ポリブテン、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、  
ゴムラテックス、SBR合成ラテックス、BHT、ポリソルベート80を含有する。

#### 【効能・効果】

打撲、捻挫、肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

#### 【用法・用量】

薬面の剥離紙をはがし、1日1〜3回患部に貼ってください。

#### 《用法・用量に関する注意》

- (1) 用法・用量を遵守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4) 打撲、捻挫の場合には、ハレや熱がひいてから使用してください。(5) はがした直後に入浴すると、熱感で痛みを感じることもありますので、最低30分前にはがしてください。(6) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4) 未使用分は袋のチャックをしっかりと閉めて保管してください。(5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

#### 製造販売元

救急薬品工業株式会社  
富山県射水市戸破32-7

お問い合わせ先 お客様相談窓口  
電話番号 0766-66-9901

発売元 **株式会社 富士薬品**  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地



(01)14987524904317(93)1807

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

配置期限

製造番号

N13J



ご使用後はチャックの端から強く押えて閉めてください。

キリトリせん

