

第2類医薬品

大容量75mL

税 控除 対象



近江兄弟社
メンターム
ペンソールSP

省資源化のため、
外箱が説明書を
兼ねています。
必要ときに読め
るよう大切に保管
してください。

大容量75mL



虫さされ
かゆみ

しつこいかゆみ
はれ・赤み・炎症を抑える



第2類医薬品

近江兄弟社
メンターム ペンソールSP 75mL

保管及び取扱い上の注意

- (1) 使用前にスポンジ部分を容器正立状態で軽く押して内圧を下げしてから使用してください(中の空気が抜け液の出過ぎを防ぎます)。使用後は必ずキャップを十分にしめてください。
- (2) 高温・直射日光を避け、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリ、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 本剤のついた手で目等の粘膜にふれないでください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先

株式会社 近江兄弟社 お客様相談室
TEL.0748-32-3135
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)



【容量】 75mL



4

製造販売元
株式会社 近江兄弟社
滋賀県近江八幡市魚屋町元 29

開け口

第2類
医薬品

ご使用に際して、この外箱に記載の説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

虫さされ・かゆみに 鎮痒消炎薬 〈販売名〉近江兄弟社メンタームベンソールSP

特長

- しつこいかゆみやはれ、赤みのもととなる炎症を抑えます。
- さされて炎症をおこした肌の修復を促進します。
- べたつかない液体タイプ。手が汚れず衛生的です。

効能・効果

- 湿疹 ●皮膚炎 ●あせも ●かぶれ ●かゆみ ●しもやけ ●虫さされ ●じんましん

用法・用量

1 日数回、患部に適量塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に1～2回軽く押し当て、スポンジに薬液をしみ込ませてからご使用ください。
- (2) 定められた用法、用量を守ってください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 本剤は外用にのみ使用してください。

成分・分量 (100mL中)

成分	分量	働き
デキサメタゾン 酢酸エステル	0.025g	ぶりかえすかゆみやはれ・赤み等のもととなる炎症をおさえます。
ジフェンヒドラミン 塩酸塩	1.0g	虫さされ等に伴うかゆみを おさえます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
パンテノール	1.0g	はれ・赤みをおびた肌を修復 促進させます。
イソプロピル メチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物として、エタノール、1,3-ブチレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエンを含有する。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。
4. 本剤はステロイド剤(副腎皮質ホルモン剤)デキサメタゾン酢酸エステルを含んでおり、顔面に広範囲又は長期間(2週間以上)塗布すると赤ら顔のようになることがありますので、顔面に続けて長く使用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931