

総合感冒薬 コールドカットソフトカプセル 液状かぜ薬

第②類医薬品

【コールドカットソフトカプセルの特徴】

かぜは色々な原因で発病します。症状も、くしゃみ、鼻水、せき、発熱等さまざまです。コールドカットソフトカプセルは、鼻やのどの炎症をしずめ、たんを切れやすくする消炎酵素のリゾチーム塩酸塩をはじめ、発熱、せき、頭痛など、かぜの諸症状に効果をあらわす有効成分をソフトカプセルにおさめました。中身が液状なのでよく溶けます。

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと

- (1)本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い止め薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)授乳中の人
- (4)高齢者
- (5)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7)次の症状のある人
高熱、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人
心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれます。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれます。

肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれます。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれます。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。）
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき

〔効能・効果〕

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

〔用法・用量〕

1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	2 カプセル	3 回
7 才以上15才未満	1 カプセル	
7 才未満の乳幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を必ずお守りください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3) カプセル剤の取り出し方：右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り取り出して服用してください。
（誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



〔成分・分量〕

6 カプセル（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

アセトアミノフェン	900mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	無水カフェイン	50mg
フルスルチアミン塩酸塩	6mg	リゾチーム塩酸塩	90mg(力価)
ゴオウ末	3mg		

添加物として、ポリソルベート80、無水ケイ酸、モノステアリン酸グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、グリセリン、酸化チタンを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。

〔お問合わせ先〕

愛知県厚生農業協同組合連合会 保健事業部

電話 0561-62-3167

受付時間：午前9時～午後5時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

製造販売元

愛知県厚生農業協同組合連合会

〒480-1155 愛知県愛知郡長久手町平池901番地