

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

総合かぜ薬

ビタミンB₂・ビタミンP配合

プレコル®感冒カプセル

かぜにかかると、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛等のさまざまな症状があらわれてきます。「プレコル感冒カプセル」は、くしゃみに始まるかぜのひきははじめから、せき、のどの痛み、発熱、頭痛等のかぜの諸症状に良く効くよう有効成分を配合した非ピリン系のかぜ薬です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい（眠気があらわれることがあります。）

4. 服用時は飲酒しないで下さい

5. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザに かかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。

(5) 高齢者。

(6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(8) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(9) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい 口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	3 回
15歳未満	服用しないで下さい	

《用法・用量に関連する注意》

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分・分量

成 分	分 量 (1日量6カプセル中)	働 き
アセトアミノフェン	660mg	非ピリン系の解熱鎮痛成分で「かぜ」による熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます。
エテンザミド	400mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの不快感等のアレルギー症状を取り除きます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
無水カフェイン	75mg	痛みをおさえる働きを助けます。
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	9mg	かぜの時に消耗しがちなビタミンを補給します。
ヘスペリジン（ビタミンP）	40mg	

添加物：乳糖、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、酸化チタン、黄色5号、ラウリル硫酸Na

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4) 外箱に記載の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電 話 03 (6667) 3232
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

® 登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10