

販売名:アンミナイト 第2類医薬品

ご使用に際して、この文書をよくお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 15才未満の小児。
- (3) 日替的に不眠の人。
- (4) 不眠症の診断を受けた人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(無効用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気をもよおして事故を起こすことがある。また、本剤の服用により、翌日まで眠気が残ったり、だるさを感じる場合は、これらの症状が消えるまで、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。)

4. 授乳中の方は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けること

5. 服用時は飲酒しないこと

6. 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 高齢者。(高齢者では眠気が強くあらわれ、また反作用や神経が高ぶるなどの症状があらわれることがある。)
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- (5) 次の症状のある人。排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。緑内障、前立腺肥大
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃痛、悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、頭痛、起床時の衝動感、昼間の眠気、気分不快、神経過敏、一時的な意識障害(注意力の低下、ねぼけ様症状、判断力の低下、言動の異常等)
その他	動悸、倦怠感、排尿困難

(2) 2〜3回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
□のかわき、下痢

その他の注意

翌日まで眠気が残ったり、だるさを感じる日がある。

【効能・効果】 一時的な不眠の次の症状の緩和：寝つきが悪い、眠りが浅い

【用法・用量】 寝つきが悪い時や眠りが浅い時、次の量を1日1回就寝前に服用する。

年 齢	1回量
成人(15才以上)	1粒(30mL)
15才未満	服用しないこと。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 1回1粒(30mL)を超えて服用すると、神経が高ぶるなど不快な症状があらわれ、逆に重くなる可能性がある。
- (3) 就寝前以外は服用しないこと。

第2類医薬品

ゼリア新薬

ヒジジの数が……

眠りが浅い

寝つきが悪い

一時的な不眠による
このような症状の緩和



睡眠改善薬

アンミナイト

ドリンクタイプ 30mL

【成分】 1日量(1瓶30mL)中
ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg、添加物：エリスリトール、スクラロース、カラメル、安息香酸Na、クエン酸Na、香料、エタノール、バニリン、D-ソルビトール、pH調節剤2成分、その他1成分

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



4 987103 045069

品名コード 5937

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11
お客様相談室 ☎ 03-3681-2080
受付 9:00〜17:50(土日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号

使用期限

アンミナイトはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。