

使用するときは、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

のどの炎症によるのどの痛み、口腔内の殺菌、口臭の除去に

フェロップストローチ[®]

のどの炎症は、痛みやはれ等の不快な症状を起こしますので、早めのお手当てが大切です。「フェロップストローチ」は抗炎症作用を有す薬用ハーブ〔カモミール〕由来の有効成分アズレンスルホン酸ナトリウムに加え、グリチルリチン酸二カリウム、キョウ流工キス、殺菌成分のクオールヘキシジン塩酸塩を配合したトローチ剤で、のどの炎症をしずめ、のどの不快な症状を改善します。

お口の中で、かまずにできるだけゆっくり溶かして服用してください。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分、クオールヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用してください。

年齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1錠	4～6回
15歳未満	使用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1.定められた用法、用量をお守りください。
- 2.本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- 3.かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。
- 4.使用の直前に1錠ずつ押し出して使用してください。
- 5.本剤の取り出し方:図のように、本剤の入っているPTPシートの凸部を指先で押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(切り離れたPTPシートごと誤って飲み込みますと、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりますのでご注意ください。)




【成分・分量】1日量(6錠)中

成 分	分 量	作 用
クロルヘキシジン塩酸塩	30mg	抗菌作用があり、口腔内の殺菌・消毒
アズレンスルホン酸ナトリウム	4.8mg	咽喉炎・扁桃炎などに広く用いられている消炎剤
グリチルリチン酸二カリウム	15mg	抗炎症作用があり、のどの炎症を抑制
キキョウ流エキス	400mg	抗炎症作用があり、のどの炎症を抑制

添加物として、白糖、トウモロコシデンプン、マクロゴール、ポビドン、トメントール、部分アルファア化デンプン、ステアリン酸Mgを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- 4.PTPシートを切り離すときは、変質の原因となりますので、使用しない本剤の裏面のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。又、切り離れたPTPシートの角で、手指などを傷つけないようご注意ください。
- 5.使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。
- 6.外箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。
- 7.一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- 8.この説明文書には、本剤を使用するときに必要な注意事項などが記載されていますので、使用が終わるまで本剤とともに外箱に入れて保管してください。



説明文書はいつでも
読めるように外箱に保管



お問い合わせ先

- お買い求めの薬局、薬店
- 京都薬品工業株式会社
〒604-8444 京都市中京区西ノ京月輪町38番地 TEL.075-803-1078
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

®：登録商標

製造販売元 **京都薬品工業株式会社**
京都市中京区西ノ京月輪町38番地