

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

〔包 装〕 14包・28包・42包

胃の痛み・胃もたれに効く スクラート胃腸薬(顆粒)

本剤の特徴

こんな方に
効きます。



胃の痛み



胃もたれ



胸やけ



胃のむかつき

●胃の粘膜を^①守って治す^②胃腸薬です。

スクラルファートが胃の粘膜を直接保護し、症状をとります。さらに、アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミンが炎症をしずめ、スクラルファートとともに症状のもととなる荒れた胃をもとどりにしていきます。

●すばやくそして持続的に胃酸をおさえる制酸剤を配合しています。

すばやくそして持続的に働く制酸剤のケイ酸アルミン酸マグネシウムと合成ヒドロタルサイトが、症状のもととなる胃酸を効果的に中和します。さらに、ロートエキスが胃の神経をしずめ、胃酸の分泌をおさえます。

●すばやくとける顆粒剤です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
- 2.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
- 3.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
- 4.長期連用しないでください



■ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。
排尿困難
(7)次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
- (2)2週間位服用しても症状がよくならない場合
- 3.次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき、はきけ、便秘、下痢

■ その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効 能

- 胃痛、胸やけ、げっぷ(おくび)、胃酸過多
- 胃部不快感、飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- もたれ(胃もたれ)、胃重、胃部膨満感、胸つかえ

用法・用量

次の1回量を1日3回、食間及び就寝前
に服用します。

年 齢	1回量
成人(15才以上)	1包
15才未満の小児	服用しないこと

〈服用法(1日3回)〉



＜用法・用量に関連する注意＞

用法及び用量を厳守してください。

成 分



2顆粒

1包(1.43g)中	
白色の顆粒	スクラルファート水和物……………500mg ケイ酸アルミン酸マグネシウム……………375mg ロートエキス……………10mg
淡紫色の顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム……………2mg L-グルタミン……………133mg 合成ヒドロタルサイト……………90mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、カルボキシメチルスターチNa、CMC、二酸化ケイ素、香料を含有します。

※本剤の青みがかった色は有効成分(アズレンスルホン酸ナトリウム)の色です。服用に支障はありません。

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた商品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ライオン株式会社 お客様相談室
☎(03)3621-6830 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7