

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

胃のもたれ・胃の痛みに効く スクラート胃腸薬S(錠剤)



本剤の特徴

- 胃の弱り、疲れ、食べ過ぎ、飲み過ぎなどの様々な原因からくるあなたの「胃のもたれ、胃の痛み」に優れた効果を発揮する胃腸薬です。
- スクラルファートと7つの健胃生薬、制酸剤、消化酵素による3つの作用により、荒れた胃や弱った胃をスッキリ元気に改善していきます。

1 スクラルフアートが効く



胃の粘膜を守って治していきます。

- スクラルファートが荒れて傷ついた胃粘膜にいち早く付着して、胃酸等の刺激物から持続的に保護、修復していきます。


2 制酸剤と消化酵素が効く



胃の粘膜への刺激を緩和しながら、弱った胃への負担を軽くしていきます。

- 2種類の制酸剤(炭酸水素Na、合成ヒドロタルサイト)が出すぎた胃酸をすばやく、そして持続的に中和し、荒れて傷ついた胃への刺激を緩和していきます。
- さらに2種類の消化酵素(ビオチンアスターゼ、リパーゼ)が協力して胃の消化機能を総合的に手助けし、弱った胃への負担を軽くしていきます。

3 7つの健胃生薬が効く



弱った胃を元気にしていきます。

- 7つの健胃生薬が胃の働きを高め、弱った胃をじっくり回復させて、元気な胃にしていきます。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 高齢者。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の診断を受けた人。 腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘

効 能

- 胃痛、胸やけ、げっぷ(おくび)、胃酸過多
- 胃部不快感、飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- もたれ(胃もたれ)、胃重、胃部膨満感、胸つかえ
- 食べ過ぎ(過食)、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、消化不良による胃部・腹部膨満感

用 法・用 量

次の1回量を1日3回、食間・就寝前又は食後に服用します。

※食間とは、朝食及び昼食後2時間ぐらいいいます。

年 齢	1 回 量
成人(15才以上)	3錠
15才未満の小児	服用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

用法及び用量を厳守してください。


成 分

上・下層(淡褐色)

- スクラルファート水和物……191.35mg
- 炭酸水素ナトリウム……200mg
(速効性制酸剤)
- 合成ヒドロタルサイト……160mg
(持続性制酸剤)
- 健胃生薬末……234mg

【ウイキョウ……20mg
ウコン……20mg
ケイヒ……100mg
ゲンチアナ……10mg
サンショウ……4mg
ショウキョウ……40mg
チョウジ……40mg】

3錠(1回量)中



中層(白色)

- スクラルファート水和物……308.65mg
(上・下層のスクラルファートとの
合計量:500mg)
- ビオチンアスターゼ2000……10mg
(でんぷん消化酵素)
- リパーゼAP12……10mg
(脂肪消化酵素)

添加物として、D-マンニトール、L-メントール、硬化油、マクロゴール、カルボキシメチルスターチNa、二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、セルロース、香料を含有します。

※本剤には生薬末(生薬:薬用の草根木皮)が配合されていますので、製品により色が多少異なることがあります。また、生薬末は7つの生薬を凍結粉碎したものです。また、製品によっては生薬の繊維が目につくことがあります。どちらの場合も品質・効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた商品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6830 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7