

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮咳去痰薬

和漢薬エキス配合

第②類医薬品

ぜん みょう じょう
喘 妙 錠 A

喘妙錠Aは、マオウ、カンゾウなど気管支拡張、鎮咳去痰作用を有する7種類の和漢薬エキスと、ノスカピンなど洋薬成分を効果的に配合した、鎮咳去痰薬です。気道粘膜のアレルギー症状に伴うせき、夜間のせき込み、かぜの後のせき、たんの切れが悪いなどの症状に優れた効果をあらわします。

⚠️ 【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、線内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください：
口のかわき、眼気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

※【効能・効果】

せき、喘鳴（ゼーゼー、ひゅーひゅー）をともなうせき、たん

〔用法・用量〕

下記1回量を1日4回、毎食後及び就寝前に服用してください。

年齢	成人 (15歳以上)	11歳以上 15歳未満	8歳以上 11歳未満	5歳以上 8歳未満	5歳未満
1回量	4錠	2.5錠	2錠	1錠	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕

灰褐色～茶褐色の割線入りの錠剤で、16錠（成人1日服用量：4.8g）中に、次の成分を含有します。

成 分	分 量
マオウ乾燥エキス（原生葉として3gに相当）	500 mg
カンゾウ乾燥エキス（原生葉として1gに相当）	200 mg
ショウキョウ乾燥エキス（原生葉として1gに相当）	100 mg
ケイヒ乾燥エキス（原生葉として1gに相当）	45.5 mg
サイシン乾燥エキス（原生葉として1gに相当）	100 mg
ゴミシ乾燥エキス（原生葉として1gに相当）	277.8 mg
ハンゲ乾燥エキス（原生葉として2gに相当）	80 mg
ノスカピン	48 mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	240 mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8.2 mg
無水カフェイン	120 mg


添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、トウモロコシデンプン、リン酸水素Ca、乳糖、セルロース、クロスCMC-Na、CMC、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mgを含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は、和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります、効果には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることもあります。）
- (4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。
- (5)本剤をぬれた手で取り扱わないでください。（水分が錠剤に付くと、変色又は色むらを生じることがあります。）
- (6)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (7)使用期限（外箱に表示）を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

アスゲン製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：0572-68-1865

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

アスゲン 製薬株式会社

岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008