

使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

点眼薬

目の疲れ・結膜充血・眼病予防

ブライGII[®] 「目薬」 15mL

◆ブライGIIは、目の疲れやかゆみ、充血をやわらげ、低下した目の調節機能を改善する目薬です。また、外出時のほこりや汗、紫外線による目のトラブルの予防、ハードコンタクトレンズ装着時の不快感に優れた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
激しい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 目のかすみ改善されない場合
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効 能 ・ 効 果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用 法 ・ 用 量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

裏面もお読みください。

- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
 (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
 (6) 点眼用にのみ使用してください。

成分・分量

100mL中

成分	含量	はたらき
ナファズリン塩酸塩	2mg	結膜の血管を収縮させ、目の充血を取り除きます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	目のピント調節をする毛様体に直接作用して、目の疲れやかすみを取り除きます。
アラントイン	200mg	結膜の炎症をしずめ、目の組織を修復します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	目のかゆみや充血などの不快なアレルギー症状をやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg	目の新陳代謝を活発にし、目の機能を改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	1,000mg	目のはたらきを円滑にして、目の疲れやかすみを回復します。
タウリン	100mg	角膜を保護し、新陳代謝を高めます。

添加剤：ホウ酸、ホウ砂、パラベン、クロロブタノール、l-メントール 含有
 こんな時に2～3滴！



目の充血に



目のつかれ



海や山で

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど高温下に放置しないでください。
 (容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。)
- (6) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。
 また配置期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)
 電話 (048)648-1118 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地