

ジクロテクトテープL

●ジクロテクトテープLは、医療用成分ジクロフェナクナトリウムを配合した外用の鎮痛消炎テープ剤です。

- 1日1回貼るだけで24時間効果が持続し、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みを鎮めます。
- 広い患部に適した大判サイズ【10cm×14cm】です。
- 伸縮性に優れ、関節などの可動部にもびったりフィットします。
- においが気になりません。 ●基布の色はベージュなので肌になじみ目立ちません。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15才未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください
4. 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 他の医薬品を使用している人。(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。
(6) 次の診断を受けた人。
消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用中又は使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(ろくせつ)(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
接触皮膚炎、光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがる場合があります。また、日光があたった部位に症状があらわれ、悪化することがあります。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。



4 987306 063334

効能

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1枚を患部に貼ってください。ただし、1回あたり1枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

[注意](1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 1回あたり24時間を超えて貼り続けしないでください。さらに、同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから使用してください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6) 使用部位に他の外用剤を併用しないでください。

成分

膏体100g中 ジクロフェナクナトリウム……………1g
(痛みや炎症の原因物質であるプロスタグランジンの生成を抑え、痛みをやわらげます)

添加物: エステルガムHG、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、流動パラフィン、ポリイソブチレン、N-メチル-2-ピロリドン、ジブチルヒドロキシトルエン、トメントール、その他3成分

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

http://www.taisho.co.jp

製造販売元

同仁医薬化工株式会社

東京都中野区弥生町5-2-2

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00(土、祝日を除く)

副作用被害救済制度の
問い合わせ先(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/
kenkouhigai.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ここから
開封して
ください

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 品質保持のため、開封後の未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんとして保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。