

とう き しゃくやく さん りょう

当帰芍薬散料 A エキス錠 三和生薬

当帰芍薬散料Aエキス錠 三和生薬は、漢方処方「当帰芍薬散料」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 胃腸の弱い人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

成 分

本品1日量18錠（1錠0.35g）中

当帰芍薬散料A水製エキス 2.8 g

トウキ 1.8 g	ブクリョウ 2.4 g
センキュウ 1.8 g	ビャクジュツ 2.4 g
シャクヤク 2.4 g	タクシャ 2.4 g

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、カルメロースCa、カルメロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	6錠
7才～14才	4錠
5才～6才	3錠
5才未満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1