

第2類医薬品

補中益気湯Aエキス細粒
「分包」三和生薬

補中益気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「補中益気湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
むくみ
(6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5〜6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

製造番号

使用期限

製造販売元



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1



開封口

ご使用に際しては、説明文を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

適応症

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：
虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1 包
7才〜14才	2/3包
4才〜 6才	1/2包
4才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …… 3包(1包2.0g)中
補中益気湯エキス (7/10量) …… 3.7g

ニンジン …… 2.80g	タイソウ …… 1.40g
ビャクジュツ …… 2.80g	ショウキョウ …… 0.35g
オウギ …… 2.10g	サイコ …… 1.40g
トウキ …… 2.10g	カンゾウ …… 1.05g
チンピ …… 1.40g	ショウマ …… 0.70g

上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(服用の原因になったり品質が変わる。)(4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

消費者くすり相談室 電話 0570-095770
10:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

10COINSKAMPO

ほちゅうえつきとう
補中益気湯

15包

第2類医薬品

MA

虚弱体質、
疲労倦怠、病後・術後の衰弱、
食欲不振に

ほちゅうえつきとう
補中益気湯

細粒
タイプ

細粒
タイプ

ほちゅうえつきとう
補中益気湯

第2類医薬品

15包
(5日分)

10COINSKAMPO

15包(5日分) 第2類医薬品

15包
(5日分)

第2類医薬品

