

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要に応じて読むように大切に保管してください。

テトラサイクリン軟膏

第2類医薬品

テトラサイクリン塩酸塩(ヒドロコルチゾン酢酸エステル配合)

テトラ・コーチゾン軟膏は、抗生物質剤 テトラサイクリン塩酸塩に、副腎皮質ホルモン剤のヒドロコルチゾン酢酸エステルを配合した軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又はテトラサイクリン系抗生物質によりアレルギーを起こしたことがある人。

(本剤の使用により、再びアレルギー症状を起こす可能性があります)

2. 次の部位には使用しないでください

(1)水痘(水ぼうそう)・疱疹、みずむし・たむし等。

(2)目や目の周囲。

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)授乳中の人。

(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6)患部が広範囲の人。

(7)湿潤やただれのひどい人。

(8)深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

- ・化膿を伴う次の諸症：湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん
- ・化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）

用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗布するかガーゼ等にのばして貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(3)外用にのみ使用してください。

(4)定められた用法を守ってください。

(5)使用する前に手を洗ってください。

(6)使用後は汚染しないように、清潔なガーゼやティッシュペーパーでチューブの先を拭き、しっかりフタをしてください。

成分と作用 1g中

成分	分量	作用
テトラサイクリン塩酸塩	30mg(力価)	テトラサイクリン感受性のブドウ球菌、レンサ球菌、大腸菌、クレブシエラ、プロテウス属によって起こる皮膚感染症に用いられます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	10mg	副腎皮質ホルモン剤で、炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。

添加物：パラオキシ安息香酸ブチル、親水ワセリン（白色ワセリン、サラシミツロウ、ステアリルアルコール、セタノール、コレステロール）、その他1成分

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社 山崎帝國堂 お客様相談係

TEL 04-7148-3412 代表

受付時間：9:00～16:30（土・日、祝日は除く）

販 売 元



白井松新薬株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16

製造販売元



株式会社 山崎帝國堂

〒277-0863 千葉県柏市豊四季73番地1

本 社

〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目1番3号

ホームページ

<http://www.dokusogan.jp>