

※この説明書は、使用前によくお読みください。
 なお、使用が終わるまでお手元に保存してください。

1583
 ©(0110)

ゴウ ージュウ
 牛黄・地竜配合

かぜ薬

かぜロダンSG

特徴

かぜロダンSGは、非ピリン系解熱鎮痛薬、中枢性の鎮咳薬、抗ヒスタミン薬、動物性生薬などを配合し、「かぜ」による発熱・せき・痛み・鼻みずなどの諸症状に効果をあらわすかぜ薬です。

1. 非ピリン系の解熱鎮痛成分が「かぜ」に伴う悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みにすぐれた効果をあらわします。
2. 鎮咳薬などが中枢に働くとともに気管支を弛げ、せきを鎮めます。
3. 抗ヒスタミン薬が配合されていますので、「かぜ」のひきはじめにみられる鼻みず・鼻づまり・くしゃみなどのアレルギー症状に効果をあらわします。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがある）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 服用時は飲酒しないでください。
6. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 （これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 便秘、口のかわき。

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

大人（15歳以上）……………1回2カプセル 15歳未満は、服用しないこと。

1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。

(2) カプセルの取り出し方。

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

(PTPシートの取り出し図)



成分・分量 1日量（6カプセル）中

アセトアミノフェン ……………	630mg	無水カフェイン ……………	75mg
エテンザミド ……………	300mg	ノスカピン ……………	48mg
d-クロロフェニラミンマレイン酸塩 ……	3.5mg	ベンフォチアミン ……………	25mg
ジヒドロコデインリン酸塩 ……………	12mg	ゴオウ ……………	3mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 ……………	60mg	ジリュウエキ散 ……………	150mg

(原生薬として300mg)

添加物として、パレイショデンプン、ラウリル硫酸Na、ゼラチン、その他2成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 配置期限をすぎた製品は使用しないでください。



製造販売元
内外薬品株式会社
富山県富山市三番町3-10

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。
内外薬品株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10
☎076 (421) 5531 受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）