

毎日のつらい痛みに
サロンパスEX
インドメタシン3.5%配合

第2類医薬品

40枚入

Hisamitsu

40枚入

サロンパスの
密着浸透力

毎日のつらい痛みに

サロンパスEX
第2類医薬品
インドメタシン
3.5%

痛みに浸透
貼りやすい
コンパクトサイズ
(サイズ:5.4cm×8.56cm)
微香性

〈微香性〉鎮痛消炎ブラスター

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)
肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

製造番号

使用期限

第2類医薬品

インドメタシン3.5%配合



毎日のつらい痛みに
サロンパスEX

毎日のつらい痛みに

サロンパスEX
インドメタシン3.5%配合

40枚入

第2類医薬品

特 長

- 1.インドメタシン3.5%配合の優れた鎮痛消炎効果。
- 2.しなやか素材採用でやさしい貼り心地でかぶれ難い。
- 3.肩こりの関係部位(肩、首の付け根、肩甲骨周辺)などに貼りやすいコンパクトサイズ。
- 4.微香性なので使っていることが気にならない。

サロンパスの「密着浸透力」とは、サロンパスを肩こりや腰痛などの時に皮ふにぴったりと貼り患部をおおうことで、有効成分が皮ふから深く浸透し痛みをジカにとります。それがサロンパスの「密着浸透力」です。



△使用上の注意

×してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

- 1.次の人は使用しないでください。
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。
(3)11歳未満の小児。
- 2.次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。
(2)湿疹、かぶれ、傷口。
(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 3.連続して2週間以上使用しないでください。

■相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

ここを
押し開けて
ください。

第2類医薬品

販売名: サロンパスEX

この説明文書は本剤とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3)患部の皮ふは清潔にして貼ってください。
- (4)皮ふの特に弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
インドメタシン……………3.5g
ℓ-メントール……………3.5g
添加物として、BHT、脂環状飽和炭化水素樹脂、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他3成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきちんと閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎたものは使用しないでください。