

P

眼科用剤

第3類医薬品

第3類医薬品

日本薬局方

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

3g×18包

ホウ酸

Boric Acid

3g×18包

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

外用剤なので飲まないでください

結膜囊の洗浄・消毒に



箱 分包：PE,セロハン



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

第3類医薬品

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

3g×18包

4

987286310961

2405

CD-4

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

眼科用剤

第3類医薬品

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

3g×18包

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 外用にのみ使用し、内服しないでください

2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

〔効能効果〕 結膜囊の洗浄・消毒

〔用法用量〕

2%以下の濃度で用いてください。

〈用法用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(3) 混濁したものは使用しないでください。(4) 眼科用にのみ使用してください。(5) 完全に溶解させてから使用してください。

〔成分分量〕

1包中 日局ホウ酸 3g含有。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) 溶かした後は速やかに使用してください。

〈貯法〉 密閉容器。室温保存。

〔希釈方法〕

2%液：本品1包(3g)をとり、水約150 mLに溶かしてください。

副作用

保管方法

