

本品には添付文書はついていません。ラベル、ケースの表示が代用しています。

[illegible]

第2類医薬品
生薬配合胃腸薬

ソルマック[®]
プラス

25mL

SOLMACK PLUS containing HERB INGREDIENTS

販売名:ソルマックプラス

服用に際して、下記又はラベルの
説明文をよくお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

● 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人、(2) 高齢者、(3) むくみのある人、(4) 高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品をもって医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
症状名:偽アルドステロン症、症状:尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
- (2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL03(3293)4509
<http://www.taiho.co.jp/>

用法・用量

成人(15歳以上)、1回1本(25mL)を1日2回服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

● 小児(15歳未満)は服用しないでください。

● 用法・用量を厳守してください。

成分 — 1日量2本(50mL)中—

ウコン流エキス	0.300mL(原生薬300mgに相当)
カンアヲ抽出物	135mg(原生薬1930.5mgに相当)
ニンジン流エキス	0.500mL(原生薬500mgに相当)
オウレンチンキ	0.826mL(原生薬247.8mgに相当)
チョウジチンキ	0.126mL(原生薬37.8mgに相当)
ゲンチアナチンキ	0.376mL(原生薬112.8mgに相当)
ソウジュツ流エキス	1.200mL(原生薬1200mgに相当)
ケイヒチンキ	0.250mL(原生薬75mgに相当)
カルニチン塩化物	120mg
添加物:ハチミツ、白糖、アラビアゴム、エデト酸Ca/2Na、L-メントール、アルコール、安息香酸Na、pH調整剤、安息香酸ベンジル、香料(アルコール 0.8 mL以下/本)	

● 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 開栓されている製品は服用しないでください。開栓後は保存しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
TEL 0120-149-931(フリーダイヤル)

®: 登録商標

S080901