

販売名:ソルマックプラス

生薬配合胃腸薬

ソルマック[®]プラス

第2類医薬品

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

<https://www.taiho.co.jp/>



副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用
期限
製造
番号



使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) ●長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)高齢者 (3)むくみのある人 (4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人 2. 服用後、まれに下記

の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診察を受けて下さい。偽アルドステロン症、ミオパチー(手足のたるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。) 3. 5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ

L1904
25mL
ガラス:瓶
金属:キャップ

用法・用量

成人(15歳以上)、1回1本(25mL)を1日2回服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を厳守して下さい。

成分

一日量2本(50mL)中— ウコン流エキス0.3mL、カンゾウ抽出物135mg、ニンジン流エキス0.5mL、オウレンチンキ0.826mL、

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

