販売名：ソルマックプラス

使用上の注意

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
●**長期連用しないで下さい。**

相談すること
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)高齢者 (3)むくみのある人 (4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人 **2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けて下さい。**偽アルドステロン症、ミオパチー（手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。）**3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。**

効能・効果

はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、もたれ（胃もたれ）、胃弱、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ

L1904

25mL

ガラス：瓶
金属：キャップ

生薬配合胃腸薬
ソルマック®プラス
第2類医薬品

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/
副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限

製造番号

用法・用量

成人（15歳以上）、1回1本（25mL）を1日2回服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。●小児（15歳未満）は服用しないで下さい。●用法・用量を厳守して下さい。

成　分

1日量2本（50mL）中　ウコン流エキス0.3mL、カンゾウ抽出物135mg、ニンジン流エキス0.5mL、オウレンチンキ0.826mL、チョウジチンキ0.126mL、ゲンチアナチンキ0.376mL、ソウジュツ流エキス1.2mL、ケイヒチンキ0.25mL、カルニチン塩化物120mg

添加物：ハチミツ、白糖、アラビアゴム、エデト酸Ca/2Na、l-メントール、アルコール、安息香酸Na、pH調整剤、安息香酸ベンジル、香料（アルコール0.8mL以下/本）●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

4514760808